

# PIPE TROTTER

## 1. Faire une pipe

- GBR *To give a blowjob*
- ESP *Hacer una mamada*
- ITA *Fare un pompino*
- DEU *Blasen*

## 2. T'as une capote?

- GBR *You got a condom?*
- ESP *¿Tienes un condon?*
- ITA *Hai un preservativo?*
- DEU *Du hast ein Kondom?*

## 3. Sans les dents

- GBR *Without teeth*
- ESP *Sin los dientes*
- ITA *Senza i denti*
- DEU *Ohne Zähne*

## 4. Sucrer

- GBR *To suck*
- ESP *Mamar*
- ITA *Succhiare*
- DEU *lutschen*

## 5. Ne jouis pas dans ma bouche!

- GBR *Don't come in my mouth!*
- ESP *¡No te corras en mi boca!*
- ITA *Non venirmi in bocca!*
- DEU *Komm nicht in meinem Mund!*



La pipe du routard: pour sucer dans toutes les langues...

SUCE ET ASTUCES

Quelques recettes pour pimenter tes pipes...

Il paraît que c'est meilleur avec des produits bio!

### Le chantilly

Un classique... La texture de la mousse apportera douceur et volupté à tes jeux de langue.

### Le champagne

Une lichette de champagne en bouche... les picotements des bulles le surprendront à coup sûr!

### Le glaçon

Prends le glaçon en bouche avant de sucer ton partenaire. Le chaud / froid le fera frissonner de plaisir!

### Le bonbon à la menthe forte

Il commence à fondre dans ta bouche, garde-le alors dans le creux de ta joue... Fraîcheur garantie.

### Le petit + accessoire

Pour maintenir l'érection de ton partenaire et en profiter plus, entoure la base de sa bite d'un ruban ou d'un lacet et fais un petit nœud coulant (pas trop serré).

TU SUCES ?



#3

# LA GONOCOCCIE

## De quoi parle-t-on ?

La gonorrhée ou blennorragie est une infection due à une bactérie, « Neisseria Gonorrhoeae » ou gonocoque.

## Est-elle fréquente ?

Oui, ces dernières années, elle est en nette progression dans la communauté gay.

## Comment ça se transmet ?

Lors d'une fellation (la bactérie peut alors se loger dans la bouche, la gorge) ou d'un rapport anal non protégés.

## Quels sont les signes ?

Ils apparaissent quelques jours après la contamination :

- Le plus courant est l'urétrite aiguë, avec sensations de brûlures en urinant (la fameuse chaude-pisse!), écoulement de pus au bout du gland, inflammation de l'urètre.

Une séance SM, c'est du pipi de chat à côté!

- Moins fréquent : irritation de l'anus et/ou du rectum (rectite) avec possibilité d'écoulements.

- L'infection peut aussi se situer dans la gorge (pharyngite).

*Attention, il n'y a parfois aucun symptôme...*

## Ça se soigne ?

Oui, avec des antibiotiques, en injection ou par voie orale. Non traitée, la gonorrhée peut infecter les testicules (gonflement et douleurs, avec un risque important de stérilité), la prostate (prostatite) et provoquer des douleurs articulaires (arthrite gonococcique).

## Où et quand consulter ?

Régulièrement, dans le cadre d'un check-up sexuel, surtout si tu as de nombreux partenaires, et rapidement en cas d'écoulement de pus, urétrite, rectite...

Les analyses sont réalisées à partir d'un échantillon d'urine, d'un prélèvement urétral, rectal, dans la gorge. Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé ou un CIDDIST<sup>1</sup>.

## Fellation et gonococcie : comment prévenir ?

Tant que tu es sous traitement, évite les pipes. Prévenir tes partenaires leur permettra d'être traités si besoin et t'évitera une nouvelle contamination.

La capote reste ce qu'il y a de mieux contre le risque de transmission de la gono.

# BONNES PRATIQUES DE LA FELLATION

Autant que possible, utilise un préservatif. Si tu n'utilises pas de préservatif :

**Toi suceur :** avant et après la pipe, évite tout ce qui peut aggraver tes muqueuses buccales (brossage de dents, curage interdentaire, bains de bouche alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui a une IST<sup>2</sup> tu peux contaminer un autre partenaire sucé dans la foulée. Enfin, évite d'avoir du sperme<sup>3</sup> en bouche pour limiter le risque de contamination par le VIH.

**Toi sucé :** évite d'éjaculer dans la bouche de ton partenaire si tu n'es pas certain de ton statut vis-à-vis du VIH. Veille à l'hygiène de ta queue en la chouchoutant - sans excès - avec des produits lavants doux, non irritants.

1. Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
2. Infection sexuellement transmissible
3. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

# VIH ET AUTRES IST

Les IST non soignées, dont la gonococcie, peuvent augmenter le risque de contracter le VIH lors de rapports non protégés. Si tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car tu peux être plus sensible aux IST.

D'une façon générale, il est conseillé à tous de s'inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge, et de se rendre chez le médecin pour des check-up réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec son médecin de sa santé sexuelle. Si c'est difficile, renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info Service pour obtenir des contacts.



Le Kiosque Infos Sida  
01 44 78 00 00  
[www.lekiosque.org](http://www.lekiosque.org)

Sida Info Service  
0 800 840 800

Réalisé  
avec le soutien  
financier de  
l'INPES